

| レジメン名 | CDDP + DTX + BV |
|---------|-----------------|
| 対象疾患名 | 非小細胞肺癌 |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 高度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|-----------------------------|-------------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 生食 硫酸Mg | 500mL 10mEq | 点滴静注 | 1時間 | day 1 |
| 2 | アクチット フロセミド注 | 500mL 20mg | | 1時間 | |
| 3 | パロノセトン注 アロカリス注 デキサート注 | 0.75mg 50mL 235mg 9.9mg | | 30分 | |
| 4 | ブドウ糖 ドセタキセル(DTX)注 | 250mL 60mg/m ² | | 1時間 | |
| 5 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 6 | 生食 シスプラチン(CDDP)注 | 500mL 80mg/m ² | | 1時間 | |
| 7 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 8 | 生食 アバスチン(BV)注 | 100mL 15/mgkg | | 初回90分 60分→30分 | |
| 9 | 生食 | 500mL | | 1時間 | |
| 10 | ソルアセトF | 500mL | | 1時間 | |
| 11 | アクチット | 500mL | | 1時間 | |
| 12 | デカドロン錠 | 4mg 2T/朝昼 | | 内服 | (3日分) |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、腎障害、浮腫、爪障害、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- CDDP: 腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1を推奨)。
- DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。
- BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間空ける。