

レジメン名	RAM + DTX
対象疾患名	非小細胞肺癌
1クールの日数	21日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1
2	生食 デキサート注	50mL 6.6mg	点滴静注	15分	
3	生食 サイラムザ (RAM)注	250mL 10mg/kg		初回1時間 2回目以降30分	
4	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 ドセタキセル (DTX)注	250mL 60mg/m ²		1時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼	内服	(3日分)	day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、脱毛、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、浮腫、爪障害、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。
- RAM: 手術前後は4週間、ポート増設時は2週間空ける。