

レジメン名	キイトルーダ
対象疾患名	尿路上皮がん
1クールの日数	21日 or 42日
催吐性リスク	最小度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 キイトルーダ注	100mL 200mg or 400mg		30分	
3	生食	50mL		5分	

※3週間に1回の場合は200mg、6週間に1回の場合は400mgで投与

【主な副作用】

間質性肺炎、大腸炎、肝障害、腎障害、皮膚障害、甲状腺機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、重症筋無力症、神経障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- ・免疫療法施行前に必要な検査を行う。胸部XP、心電図、造影CT検査も実施する。
- ・ルーチンの採血検査 + 以下の検査を1～3ヶ月ごとに施行する。

- 間質性肺炎: KL-6 SP-D 胸部CT
- 甲状腺機能障害: TSH FT4 FT3
- 下垂体機能障害・副腎不全: ACTH コルチゾール
- 1型糖尿病: 血糖 HbA1c C-ペプチド
- 大腸炎: 内視鏡検査 造影CT
- 肝障害: エコー 造影CT