

レジメン名	C-mab + PTX
対象疾患名	咽頭がん
1クールの日数	56日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食 デキサート注 ポララミン注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 5mg 20mg	点滴静注	15分	day 1, 8, 15, 22, 29, 36
2	生食	50mL		15分	
3	生食 アービタックス (C-mab)注	250-500mL 初回400mg/m ² 2回目～ 250mg/m ²		初回:2時間 2回目～1時間	
4	生食	100mL		30分	
5	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	250mL 80mg/m ²		1時間	
6	ブドウ糖	50mL		5分	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、皮膚障害(皮膚乾燥、ざ瘡様皮疹、爪囲炎、掻痒症)、低Mg血症、Infusion reaction

【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- C-mab: 皮膚障害対策として保湿剤、ステロイド外用剤、ミノサイクリンを使用する。