

| レジメン名 | SP(3w) |
|---------|--------|
| 対象疾患名 | 胃がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 高度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|--------|---------------|
| 1 | 生食 硫酸Mg | 500mL 10mEq | 点滴静注 | 1時間 | day 1 |
| 2 | アクチット注 フロセミド注 | 500mL 20mg | | 1時間 | |
| 3 | パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注 | 0.75mg 50mL 235mg 9.9mg | | 30分 | |
| 4 | 生食 シスプラチン (CDDP)注 | 500mL 60mg/m ² | | 1時間 | |
| 5 | 生食 | 500mL | | 1時間 | |
| 6 | ソルアセトF | 500mL | | 1時間 | day 1, (2, 3) |
| 7 | アクチット | 500mL | | 1時間 | day 1, (2, 3) |
| 8 | エスワンタイホウ (S-1) | ※80mg/m ² | 内服 | (14日分) | day1(夕)-15(朝) |
| 11 | デカドロン錠 | 4mg 2T/朝昼 | | (3日分) | day 2-4 |

【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m²): 1.25未満 20mg 4錠/日 1.25~1.5未満 25mg 4錠/日
1.5以上 20mg 6錠/日

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、口内炎、腎障害、肝障害、流涙、浮腫、電解質異常、神経障害(末梢神経障害、聴力障害)

【その他注意事項】

- CDDP:腎障害予防として、飲水指導を実施(OS-1推奨)。
- S-1:ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。