

|         |     |
|---------|-----|
| レジメン名   | SOX |
| 対象疾患名   | 胃がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク  | 中等度 |
| その他注意事項 |     |

| No | 薬剤名                          | 標準投与量                         | 投与方法 | 投与時間   | 投与日           |
|----|------------------------------|-------------------------------|------|--------|---------------|
| 1  | グラニセトロン注<br>デキサート注           | 1mg 50mL<br>9.9mg             | 点滴静注 | 15分    | day 1         |
| 2  | ブドウ糖<br>オキサリプラチン<br>(L-OHP)注 | 500mL<br>100mg/m <sup>2</sup> |      | 2時間    |               |
| 3  | ブドウ糖                         | 50mL                          |      | 5分     |               |
| 4  | エスワンタイホウ<br>(S-1)            | ※80mg/m <sup>2</sup>          | 内服   | (14日分) | day1(夕)-15(朝) |

#### 【S-1投与量(処方目安)】

体表面積(m<sup>2</sup>) : 1.25未満 20mg 4錠/日    1.25~1.5未満 25mg 4錠/日  
1.5以上 20mg 6錠/日

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、口内炎、色素沈着、流涙、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、アレルギー、血管痛(末梢投与の場合)

#### 【その他注意事項】

- S-1: ワーファリン、フェニトインと薬物相互作用あり(併用薬の作用増強)。
- L-OHP: アレルギーは7~8回目で起こりやすい。