

レジメン名	weekly PTX + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 8, 15
2	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1, 8, 15, 22
3	生食 ハーセプチン (T-mab)注	250mL 初回4mg/kg 2回目～2mg/kg		初回90分 2回目～30分	
4	生食	50mL		5分	
5	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg		15分	day 1, 8, 15
6	ブドウ糖	50mL		30分	
7	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	250mL 80mg/m ²		1時間	
8	ブドウ糖	50mL		5分	

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。