

レジメン名	weekly PTX + BV
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	28日
催吐性リスク	軽度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠	50mg	内服	投与前	day 1, 8, 15
2	ブドウ糖 デキサート注 ファモチジン注	50mL 6.6mg 20mg	点滴静注	15分	
3	ブドウ糖	50mL		30分	
4	ブドウ糖 パクリタキセル (PTX)注	250mL 90mg/m <sup>2</sup>		1時間	
5	生食	50mL		5分	
6	生食 アバスチン(BV)注	100mL 10mg/kg		初回90分 60→30分	day 1, 15
7	生食	50mL		5分	

#### 【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、倦怠感、脱毛、骨髄抑制、肝障害、関節痛・筋肉痛、末梢神経障害、過敏症、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、Infusion reaction

#### 【その他注意事項】

- PTX: アルコール過敏症は投与不可。CYP2E8、3A4阻害薬との併用で作用増強。
- BV: 手術前後は4週間、ポート増設時は1週間空ける。