

レジメン名	TC + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	※FN高リスク

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日		
1	生食	50mL	点滴静注	15分	day 1		
2	生食 ハーセプチン (T-mab)注	250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分			
3	生食	50mL		5分			
1	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 9.9mg		15分			
2	ブドウ糖 ドセタキセル(DTX)注	250mL 75mg/m ²		1時間			
3	ブドウ糖	50mL		5分			
4	生食 エンドキサン(CPA)注	250mL 600mg/m ²		30分			
5	生食	50mL		5分			
6	デカドロン錠	4mg 2T/分2		内服		(3日分)	day 2-4

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、倦怠感、口内炎、脱毛、出血性膀胱炎、骨髄抑制、肝障害、神経障害、浮腫、爪障害、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

※発熱性好中球減少(FN)対策としてジーラスタの使用考慮。

●CPA: 出血性膀胱炎対策として水分摂取を心がける。

●DTX: アゾール系抗真菌薬、エリスロマイシン、クラリスロマイシンと薬物相互作用あり(DTXの作用増強)。

●T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。