

| | |
|---------|---------------|
| レジメン名 | ハラヴェン + T-mab |
| 対象疾患名 | 乳がん |
| 1クールの日数 | 21日 |
| 催吐性リスク | 軽度 |
| その他注意事項 | |

| No | 薬剤名 | 標準投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
|----|--------------------------|---------------------------------|------|------------------|----------|
| 1 | 生食 デキサート注 | 50mL 6.6mg | 点滴静注 | 15分 | day 1, 8 |
| 2 | 生食 ハラヴェン (ERI)注 | 50mL 1.4mg/m ² | | 5分 | |
| 3 | 生食 | 50mL | | 5分 | |
| 4 | 生食 ハーセプチン (T-mab)注 | 250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg | | 初回90分 2回目～30分 | day 1 |
| 5 | 生食 | 50mL | | 5分 | |

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、下痢、脱毛、味覚障害、口内炎、倦怠感、頭痛、筋肉痛、耐糖能異常、骨髄抑制、肝障害、末梢神経障害、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

T-mab: 投与前に心エコー検査行い、LVEFが50%以上か確認する。