

レジメン名	GEM + CBDCA + T-mab
対象疾患名	乳がん
1クールの日数	21日
催吐性リスク	中等度
その他注意事項	

No	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食	50mL	点滴静注	5分	day 1
2	生食 ハーセプチン注 (T-mab)	250mL 初回8mg/kg 2回目～6mg/kg		初回90分 2回目～30分	
3	生食	50mL		5分	
4※	パロノセトロン注 アロカリス注 デキサート注	0.75mg 50mL 235mg 3.3mg		30分	day 1, 8
5	ブドウ糖 ゲムシタビン (GEM)注	100mL 1000mg/m ²		30分	
6	ブドウ糖	50mL		5分	
7	ブドウ糖 カルボプラチン (CBDCA)注	250mL AUC = 5		1時間	day 1
8	ブドウ糖	50mL		5分	
9	デカドロン錠	4mg 2T/朝昼		内服	(2日分)

※day 8の前投薬はデキサート3.3mgのみ

【主な副作用】

悪心、嘔吐、食欲不振、倦怠感、骨髄抑制、肝障害、発熱、発疹、血管痛、心障害、Infusion reaction

【その他注意事項】

- GEM: 点滴時間延長で副作用が増強。
- T-mab: 投与前に心エコー検査を行い、LVEFが50%以上か確認する。